



CENTRO DIAGNOSTICO SOLBIATESE S.r.l.

via dei Patrioti, 65 – 21058 Solbiate Olona (VA)

Tel. 0331.641111 Fax 0331.642229

.cdssnc.com – info@cdsmed.com

Modulo MSQ 30.4_b rev. 1 del 16.05.2018

**CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT)
PER CURVA GLICEMICA E/O INSULINEMICA
(in gravidanza)
Informativa e consenso**

FINALITÀ DEL TEST

Il Carico Orale di Glucosio (OGTT) per curva glicemica e/o insulinemica è un'indagine dinamica che permette di evidenziare un diabete latente, una eventuale predisposizione ad ammalare di diabete, la risposta secretiva del pancreas.

ESECUZIONE DEL TEST

Il test da carico orale di glucosio(/insulina), richiesto dal Suo medico, nella nostra struttura, si effettua somministrandolo per via orale, a digiuno, una quantità standard di una soluzione glucosata:

Curva Standard: **75 g** (donne in gravidanza come da linee guida:
Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito. AMD SID Diabete Italia, Raccomandazioni 2015)

La somministrazione della soluzione glucosata (Glucosio Sclavo) sarà effettuata solo in presenza di un valore di glicemia, determinata a digiuno prima della somministrazione, inferiore a 92 mg/dL. Dopo l'assunzione del glucosio, ad intervalli predefiniti (60, 120 min.) Le saranno prelevati campioni di sangue venoso.

Valore soglia della glicemia a digiuno: 92 mg/dL (Non procedere se superiore)

Valore analizzatore: _____ mg/dL
(Abbott Architect ci4100)

Firma dell'operatore: _____

- Curva non eseguita per valore di glucosio basale superiore alla soglia stabilita (92 mg/dL)
- Curva non eseguita perché il paziente ha vomitato
- Curva non eseguita per _____

AVVERTENZE

L'assunzione di glucosio potrebbe determinare l'insorgenza di effetti secondari quali nausea, sonnolenza e sete, di regola di lieve entità e di breve durata. In caso di vomito intervenuto prima dell'ultimo prelievo il test deve essere ripetuto in altra giornata, compresa la determinazione della glicemia basale.

Il test non ha valore diagnostico in situazioni che possono interferire con l'assorbimento e l'utilizzo del glucosio (stati febbrili, traumi, gastroenterostomosi, etc.). In caso di diagnosi di diabete mellito gestazionale dovrà essere predisposto un controllo con OGTT in un periodo compreso tra le 6 settimane e i 6 mesi dopo il parto.

CONSENSO DEL PAZIENTE

Il sottoscritto _____
dichiara di essere stato adeguatamente edotto tramite la presente
informativa in modo chiaro e comprensibile sulle finalità e modalità
di esecuzione del carico orale di glucosio per curva glicemica
e/o insulinemica, nonché dei relativi rischi a cui si espone e pertanto:

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ad essere sottoposto all'esame richiesto

data _____

firma _____