



**CENTRO DIAGNOSTICO SOLBIATESE S.r.l.**

via dei Patrioti, 65 – 21058 Solbiate Olona (VA)

Tel. 0331.641111 Fax 0331.642229

[.cdssnc.com](http://.cdssnc.com) – [info@cdsmed.com](mailto:info@cdsmed.com)

Modulo MSQ 30.4 rev. 7 del 16.05.2018

**CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT)  
PER CURVA GLICEMICA E/O INSULINEMICA  
Informativa e consenso**

**FINALITÀ DEL TEST**

Il Carico Orale di Glucosio (OGTT) per curva glicemica e/o insulinemica è un'indagine dinamica che permette di evidenziare un diabete latente, una eventuale predisposizione ad ammalare di diabete, la risposta secretiva del pancreas.

**ESECUZIONE DEL TEST**

Il test da carico orale di glucosio(/insulina) richiesto dal Suo medico, si effettua somministrandoLe per via orale, a digiuno, una quantità standard di una soluzione glucosata:

Curva Standard: **75 g** (soggetti adulti e donne in gravidanza come da nuove linee guida:  
Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito. AMD SID Diabete Italia, 2009-2010)

La somministrazione della soluzione glucosata (Glucosio Sclavo) sarà effettuata solo in presenza di un valore di glicemia, determinata a digiuno prima della somministrazione, inferiore a 126 mg/dL. Dopo l'assunzione del glucosio, ad intervalli predefiniti (60, ev. 90, 120 min.) Le saranno prelevati campioni di sangue venoso.

**Valore limite della glicemia a digiuno: 126 mg/dL (Non procedere se superiore)**

**Valore analizzatore:** \_\_\_\_\_ mg/dL      **Firma dell'operatore:** \_\_\_\_\_  
(Abbott Architect ci4100)

- Curva non eseguita per valore di glucosio basale superiore alla soglia stabilita (126 mg/dL)
- Curva non eseguita perché il paziente ha vomitato
- Curva non eseguita per \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE**

*L'assunzione di glucosio potrebbe determinare l'insorgenza di effetti secondari quali nausea, sonnolenza e sete, di regola di lieve entità e di breve durata. In caso di vomito intervenuto prima dell'ultimo prelievo il test deve essere ripetuto in altra giornata, compresa la determinazione della glicemia basale.*

*Il test non ha valore diagnostico in situazioni che possono interferire con l'assorbimento e l'utilizzo del glucosio (stati febbrili, traumi, gastroenterostomosi, etc.) e durante il periodo mestruale.*

**CONSENSO DEL PAZIENTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
dichiara di essere stato adeguatamente edotto tramite la presente  
informativa in modo chiaro e comprensibile sulle finalità e modalità  
di esecuzione del carico orale di glucosio per curva glicemica e/o  
insulinemica, nonché dei relativi rischi a cui si espone e pertanto:

**ACCONSENTO**

**NON ACCONSENTO**

ad essere sottoposto all'esame richiesto

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_